## Doses de Medicamentos mais usados em Pediatria

| Medicamento | Posologia | Apresentação e Vias de administração. |
|---|---|---|
| **Analgésicos e antitérmicos** | | |
| Ácido acetilsalicílico | Como analgésico: 10 a 15 mg/kg/dia, de 4/4 ou 6/6 h.<br>Como anti-inflamatório: 60 a 100 mg/kg/dia, de 6/6 ou de 8/8 h. | Via oral:<br>Comp. 100 ou 500mg<br>Gotas: 10 mg/gota |
| Ácido mefenânico | Acima de 14 anos:<br>500mg, de 8/8h | Via oral:<br>Comp. de 500mg |
| Benzidamina | Até 6 anos: 1,5 mg/kg/dose, de 6/6 ou de 8/8 h; de 6 a 14 anos: 50 mg/dose de 12/12 ou 24/24 h; acima de 14 anos: 50 mg/dose de 6/6 ou 8/8 h. | Solução oral 30 mg/ml<br>Drágea 50 mg<br>Colutório 1,5 mg/ml |
| Cetoprofeno | Acima de 1 ano: 1 gota/kg, de 6/6 ou de 8/8 h; crianças de 7 a 11 anos: 25 gotas, de 6/6 h ou 8/8h; acima de 11 anos: 50 gotas, de 6/6 ou de 8/8h; adultos: 200 ou 300 mg/dia de 8/8 h. | Cápsulas 50 mg<br>Cápsulas de liberação prolongada 160 e 320 mg<br>Injetável 100 mg<br>Gotas 20 mg/ml |
| Diclofenaco Potássico | Crianças maiores de um ano: VO – 2 a 3 mg/kg/dia, de 6/6 h ou de 12/12 h.<br>Uso tópico: aplicar até 4 g do gel na área afetada até 4 vezes por dia.<br>Uso retal: de 0,5 a 2 mg/kg de peso corporal (crianças).<br>Não se deve ser feito endovenoso, somente IM no glúteo. | Gotas: 0,5 mg/gota<br>Drágeas 50 mg<br>Supositório adulto 75 mg<br>Supositório pediátrico 12,5 e 25 mg<br>Suspensão oral 2,0 mg/ml<br>Emulgel (uso tópico) 1%<br>Ampolas 75 mg |
| Diclofenaco Sódico | Crianças: VO e IM – 2 a 3 mg/kg/dia, de 12/12 h. | Cápsulas 100 mg<br>Ampolas 75 mg<br>Supositórios 50 mg<br>Comprimidos laqueados com revestimento entérico 50 mg<br>Comprimido retard 100 mg<br>Ampolas 75 mg/3 ml<br>Emilgel (uso tópico) 1 g |
| Dipirona | Crianças com mais de 3 meses e acima de 5 kg : 10 a 25 mg/kg/dose, de 6/6 h; dose máxima 500 mg<br>Supositório: crianças de 3 a 7 anos: 300 mg, 1 a 4 vezes ao dia; crianças de 12 a 14 anos: 600 mg, 1 a 4 vezes ao dia. | Gotas 500 mg/ml<br>Comprimidos 500 mg<br>Solução injetável 500 mg/ml<br>Solução oral 50 mg/ml (20 gotas/ml)<br>Supositório infantil 300 mg |
| Ibuprofeno | 5 a 10 mg/kg, de 6/6 h; dose máxima: 40 mg/kg/dia.<br>Crianças acima de 30 kg: 1.200 mg/dia.<br>Anti-inflamatório: 30-50 mg/kg/dia ÷3-4 | Comprimidos 300 e 600 mg<br>Suspensão oral 100 mg/5 ml<br>Cápsulas 400 mg<br>Comprimidos 200 mg<br>Envelopes com grânulos de 400 e 600 mg |
| Indometacina | Crianças maiores de 2 anos: 2 | Cápsulas 25 e 50 mg |

| | | |
|---|---|---|
| | a 4 mg/kg/dia, de 8/8 h; dose máxima: 150 mg/kg/dia. | Supositórios 100 mg |
| Morfina | Via oral: 0,2 a 0,5 mg/kg, 1 a 6 vezes por dia.<br>Injetável - Neonatos: 0,05 a 0,2 mg/kg/dose, a cada 2 a 4 horas ou em administração contínua de 0,01 a 0,04 mg/kg/hora. Crianças – dose inicial: 0,05 mg/kg; manutenção: 0,1 a 0,2 mg/kg/dose, a cada 2 e 4 horas; dose máxima: 15 mg/dose; infusão contínua: 0,025 a 0,1 mg/kg/hora. | Comprimidos 10 e 30 mg<br>Solução oral 10 mg/ml<br>Cápsulas 30, 60 e 100 mg. |
| Naproxeno | Crianças acima de 2 anos – analgesia e efeito anti-inflamatório:5 a 7 mg/kg, de 8/8 ou de 12/12 h. Na doença inflamatória: 10 a 15 mg/kg/dia, de 12/12 h; dose máxima: 1.000 mg/dia. | Comprimidos de 250 e 500 mg |
| Nimesulida | Crianças acima de 12 anos: 50 a 100 mg de 12/12 h; supositórios: 50 a 100 mg, de 12/12/ h; granulado: 50 a 100 mg de 12/12 h. | Comprimidos 100 gm<br>Gotas 50 mg/ml<br>Suspensão oral 10 mg/ml e 18 mg/ml<br>Granulado 10 mg<br>Supositórios 50 e 100 mg |
| Paracetamol | Crianças: VO – 10 a 15 mg/kg de 4/4 ou de 6/6 h; dose máxima: 5 doses ao dia.<br>Supositório – 10 1 15 mg/dia. | Gotas 100 mg/ml e<br>200 mg/ml<br>Comprimidos 500 e 750 mg<br>Líquido em suspensão 160 mg/5 ml |
| Petidina | 1 a 1,5 mg/kg; dose máxima: 100 mg. | Subcutânea e intramuscular<br>Ampolas de 100 mg/2 ml e 50 mg/ml |
| Piroxicam | Acima de 1 ano: 0,4 a 0,6 mg/kg/dia, de 24/24 h.<br>Acima de 12 anos: 20 mg de 12/12 h ou 24/24 h. | Comprimidos e cápsulas de 20 mg<br>Comprimidos revestidos de 10 e 20 mg<br>Gotas 10 mg/ml<br>Sol. Injetável 40 mg/2 ml |
| Tramadol | 1 a 2 mg/kg/dose, de 4/4 ou de 6/6 h; dose máxima: 400 mg/dia | Oral, parenteral e retal<br>Gotas 50 e 100 mg/ml<br>Comprimidos e cápsulas de 50 mg<br>Comprimidos retard 100 mg<br>Solução oral 100 mg/ml<br>Ampolas 50 e 100 mg |
| **Ansiolíticos e hipnóticos** | | |
| Clobazam | Crianças abaixo de 2 anos: dose inicial de 0,5 a 1,5 mg/kg/dia, em 2 tomadas.<br>Crianças de 2 a 16 anos: dose inicial de 5 mg/dia (máximo de 40 mg/dia).<br>Adultos: dose inicial de 5 a 15 mg/dia, em 2 tomadas | Comprimidos de 10 e 20 mg |

| | | |
|---|---|---|
| | (máximo 80 mg/dia) | |
| Diazepam | VO: 1 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. Sedação oral / relaxante muscular: 0,12 a 0,8 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h. Injetável: 0,2 a 0,3 mg/kg/dose; dose máxima: 10 mg/dose.<br>Estado de epilepsia: 0,1 a 0,3 mg/kg/dose, a cada 15 a 30 minutos. | Comprimidos de 5 e 10 mg<br>Injetável de 10 mg/2 ml. |
| Hidrato de Cloral | RN: 25 mg/kg/dose, de 66 a 8/8 h<br>Crianças: 20 a 50 mg/kg/dose, 2 a 4 vezes ao dia: dose máxima: 500 mg/dose | Frasco 100 mg/ml |
| Midazolam | Sedativo – VO: 0,25 a 0,5 mg/kg; dose máxima: 20 mg.<br>Pré-anestésico: dose inicial: 0,05 a 0,1 mg/kg. | Ampolas 5 mg/5ml; 15mg/3ml, 50 mg/10ml.<br>Comprimidos 15mg |
| **Antibióticos de uso sistêmico** | | |
| Amicacina | RN – menos de 26 semanas de gestação: 7,5 mg/kg/dose, de 24/24 h; de 27 a 34 semanas: 7,5 mg/kg/dose, de 18/18 h; de 35 a 42 semanas: 10 mg/kg/dose, de 12/12 h; acima de 43 semanas: 10 mg/kg/dose, de 8/8 h.<br>Crianças: 15 mg/kg/dia de 8/8 h ou dose única. | Ampolas de 100, 250 e 500 mg/2ml |
| Amoxicilina | Menores de 3 meses: 20 a 30 mg/kg/dia, de 12/12 h.<br>RN e crianças: 50 mg/kg/dia, de 8/8 ou de 12/12 h.<br>Acima de 12 anos: 500 mg, de 8/8 h, ou 875 mg, de 12/12 h. | Suspensão de 125, 250, 400 e 500 mg/5ml.<br>Cápsulas 500 mg.<br>Comprimidos 875 mg. |
| Amoxicilina + Clavulananto de Potássio | Menores de 3 meses: 20 a 30 mg/kg/dia, de 12/12 h; dose máxima:1,5 g/dia.<br>RN e crianças: 50 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h.<br>Acima de 12 anos: 500 mg, de 8/8 h, ou 875 mg, de 12/12 h. | Suspensão oral de 125, 250, 400 e 500 mg/ml.<br>Comprimidos revestidos de 875 mg.<br>Frasco-ampola de 500 e 1.000 mg. |
| Amoxicilina + Sulbactam | Suspensão – menores de 2 anos: 1 ml/kg/dia, de 8/8 h; acima de 12 anos: 500 mg, de 8/8 h; suspensão BD: 40 mg/kg/dia, de 12/12 h.<br>Comprimidos – acima de 12 anos: 500 a 1.000 mg, de 12/12 h.<br>Injetáveis: crianças com menos de 12 anos: 60 a 75 mg/kg/dia, via IM ou IV (direta ou por infusão), em 2 ou 3 aplicações; acima de 12 anos: 1 frasco-ampola (1.500 | Suspensão oral 50 ou 100 mg/ml.<br>Comprimidos 500 mg e 1 g.<br>Cápsulas 875 mg.<br>Frasco ampola 750 e 1.500 mg. |

| | | |
|---|---|---|
| | mg) de 8/8 h, via IM ou IV (direta ou por infusão). | |
| Ampicilina | RN: 25 a 50 mg/kg/dose, IV; nos casos de meningite e sepse por *Streptococcus* B: 100 mg/kg/dose.<br>Crianças: 100 a 200 mg/kg/dia, de 4/4 ou 6/6 h; em infecções graves: 300 mg/kg/dia, de 6/6 h. | Suspensão oral 250 mg/5 ml.<br>Cápsulas 500 mg<br>Comprimidos 500 mg e 1 g.<br>Frasco-ampola de 500 e 1.000 mg.<br>Solução injetável 0,5 e 1 g. |
| Ampicilina associada a Sulbactam | RN com menos de 7 dias (especialmente prematuros): 75 mg/kg/dia (correspondendo a 25 mg/kg/dia de sulbactam e 50 mg/kg/dia de ampicilina), de 12/12 h.<br>RN e crianças: 150 mg/kg/dia, correspondendo a 50 mg/kg/dia de sulbactam e 100 mg/kg/dia de ampicilina), usualmente de 6/6 ou de 8/8 h. | Via de administração: IM ou IV<br>Pó para solução injetável 1,5 e 3,0 g. |
| Azitromicina | 10 mg/kg/dia, em dose única diária; dose máxima: 500 mg/dia. | Suspensão oral 200 mg/5 ml.<br>Comprimidos de 250, 500 e 1.000 mg. |
| Aztreonam | RN com menos de 2 kg – de 0 a 7 dias de vida: 60 mg/kg/dia, de 12/12 h, de 8 a 28 dias: 90 mg/kg/dia, de 8/8 h.<br>RN com mais de 2 kg – de 0 a 7 dias de vida: 90 mg/kg/dia, de 8/8 h; de 8 a 28 dias: 120 mg/kg/dia, de 6/6 h; acima de 28 dias: 120 mg/kg/dia, de 6/6 h.<br>Crianças: 90 a 120 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h. | Frasco-ampola 0,5 e 1,0 g. |
| Cefaclor | 20 mg/kg/dia, de 8/8 ou de 12/12 h; infecções mais graves: 40 mg/kg/dia, 12 12/12 h; dose máxima: 1 g/dia. | Suspensão oral 250 e 375 mg/5ml.<br>Cápsulas 250 e 500 mg.<br>Drágeas 375 e 750 mg. |
| Cefadroxila | 30 mg/kg/dia, de 8/8 ou de 12/12 h; dose máxima: 2 g/dia. | Suspensão oral 250 e 500 mg/5ml.<br>Cápsulas 500 mg<br>Camprimidos 1 g. |
| Cefalexina | 50 a 100 mg/kg/dia, de 6/66 h; acima de 12 anos: 500 mg, de 6/6 h. | Suspensão oral 250 mg/5ml.<br>Gotas 100 mg/ml.<br>Cápsulas, drágeas e comprimidos de 500 mg. |
| Cefalotina | RN com menos de 1,2 kg – de 0 a 4 semanas: 20 mg/kg/dose, de 12/12 h; de 1,2 a 2 kg – de 0 a 7 dias: 20 mg/kg/dose de 12/12 h; acima de 7 dias: 20 mg/kg/dose, de 8/8 h. | Frasco-ampola 1 g |

| | | |
|---|---|---|
| | RN acima de 2 kg – de 0 a 7 dias: 20 mg/kg/dose, de 8/8 h.<br>Crianças: 80 a 160 mg/kg/dia, de 4/4 ou de 6/6 h. | |
| Cefazolina | RN: 40 mg/kg/dose, via IM ou IV, de 12/12 h.<br>Crianças: 50 a 100 mg/kg/dia, via IV, de 8/8 h; dose máxima: 6 g/dia. | Frasco-ampola 1 g<br>Frasco-ampola 250 e 500 mg para via IM. |
| Cefepima | RN e crianças de até 40 kg: 50 mg/kg, 2 vezes ao dia.<br>Crianças maiores: 1 a 2 g via IM ou IV, 2 vezes ao dia; dose máxima: 2 g via IM ou IV, 2 a 3 vezes ao dia. | Frasco-ampola 500 mg, 1 e 2 g |
| Cefotaxima | RN: 100 mg/kg/dose, de 12/12 h; crianças: 100 a 200 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h. | Frasco-ampola 0,5 e 1,0 g |
| Cefprozila | 30 mg/kg/dia de 12/12 h. | Suspensão oral 250 mg/5 ml<br>Comprimidos 500 mg |
| Ceftazidima | RN: 30 mg/kg/dose, via IM ou IV, de 8/8 h.<br>Crianças: 100 a 150 mg dia, Via IV, de 8/8 h. | Frasco-ampola de 1 e 2 g |
| Ceftriaxona | RN com menos de 2 kg: 50 mg/kg, 1 vez ao dia.<br>Crianças: 50 a 100 mg/kg/dia, de 12/12 h, ou 1 vez ao dia. | Frasco-ampola para injeção IM 250, 500 e 1.000 g<br>Frasco-ampola para infusão ou injeção IV 500 e 1.000 mg |
| Cefuroxima | RN: 50 a 100 mg/kg/dia, via IM ou IV, de 12/12 h.<br>Crianças, via IV: 75 a 150 mg/kg/dia, de 8/8 h; dose máxima de 6 g/dia.<br>Oral: 30 mg/kg/dia, de 12/12 h. | Frasco-ampola 750 mg<br>Suspensão oral 125 e 250 mg/5ml<br>Comprimidos de 250 e 500 mg |
| Claritromicina | 7,5 mg/kg/dose, de 12/12 h; dose máxima: 1.000 g/dia. | Suspensão oral 125 e 250 mg/5ml.<br>Comprimidos revestidos 250 e 500 mg.<br>Ampolas 500 mg. |
| Clindamicina | Via oral – RN: 5 a 7,5 mg/kg/dose, de 8/8 h; crianças: 20 a 30 mg/kg/dia, de 6/6 h; dose máxima: 1,8 g/dia.<br>Via IV – RN com menos de 1,2 kg – 0 a 4 semanas: 5 mg/kg/dia, de 12/12 h; entre 1,2 e 2 kg – 0 a 7 dias: 5 mg/kg/dose, de 12/12 h; acima de 7 dias: 5 mg/kg/dose, de 8/8 h; mais de 2 kg – de 0 a 7 dias: 5 mg/kg/dose, de 8/8 h; acima de 7 dias: 5 mg/kg/dose, de 6/6 h; crianças: 25 a 40 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h, dose máxima: 2 g/dia. | Ampolas de 300 e 600 mg<br>Frasco-ampola 150 mg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| Cloranfenicol | 50 a 100 mg/kg/dia, de 6/6 h; dose máxima 4 g/dia. | Frasco-ampola 1 g<br>Xarope 0,272 g/5ml<br>Drágea 250 e 500 mg<br>Cápsula 250 mg |
| Doxicilina | Crianças acima de 9 anos – dose de ataque: 200 mg de 12/12 h; manutenção: 100 mg, 1 vez ao dia; dose máxima: 200 mg/dia. | Cápsulas e drágeas de 100 e 200 mg |
| Eritromicina | 30 a 50 mg/kg/dia, de 6/6 h; dose máxima: 4 g/dia. | Suspensão oral 125 e 250 mg/5ml<br>Drágeas de 250 e 500 mg<br>Comprimidos 250 e 500 mg<br>Gotas 100 mg/ml |
| Espiramicina | Crianças – dose usual: 150.000UI/kg. A dose diária deve ser dividida em 2 a 3 doses.<br>15 kg = 3 cápsulas /dia.<br>20 kg = 4 cápsulas/dia<br>30 kg = 6 cápsulas/dia | Comprimidos 250 mg<br>Comprimidos 1,5 mUI |
| Gentamicina | RN com menos de 26 semanas de gestação: 2,5 mg/kg/dose, de 24/24 h.<br>RN de 27 a 34 semanas: 2,5 mg/kg/dose, de 18/18 h.<br>RN de 35 a 42 semanas: 2,5 mg/kg/dose, de 12/12 h.<br>RN acima de 43 semanas: 2,5 mg/kg/dose, de 8/8 h.<br>Crianças: 5 a 7 mg/kg, 1 vez ao dia. | Solução injetável 20 e 40 mg<br>Solução injetável 20 mg/ml, 60 mg/1,5 ml e 80 mg/2ml.<br>Ampolas 20, 80 e 280 mg. |
| Imipenem / Cilastina sódica | RN com menos de 1,2 kg – de 0 a 4 semanas: 20 mg/kg/dia, via IV, de 18/18 a 24/24 h.<br>Neonatos com peso entre 1,2 e 2 kg: mg/kg/dose, via IV ou IM, de 12/12 h.<br>RN com peso acima de 2 kg: 20 mg/kg/dose, via IV ou IM, de 12/12 h; acima de 7 dias: 20 mg/kg/dose, de 8/8 h.<br>Crianças: 50 a 100 mg/kg/dia, via IV de 6/6 h; dose máxima: 4 g /dia. | Frasco para infusão IV 500 mg<br>Frasco-ampola + diluente para infusão IM 500 mg<br>Frasco "monovial" para infusão IV 500 mg |
| Lincomicina | Crianças acima de 1 ano.<br>Via oral: 30 a 60 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h.<br>Via IM: 10 mg/kg/dia, de 8/8 h ou 12/12 h.<br>Via IV: 10 a 20 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. | Cápsulas 500 mg<br>Solução injetável 300 mg/ml e 600 mg/2 ml<br>Ampolas de 300 e 600 mg |
| Meropenem | RN – dose para sepse: 20 mg/kg/dose, de 12/12 h.<br>Meningite e infecções causadas por *Pseudomonas*: 40 mg/kg/dose, de 8/8 h; dose máxima: 2 g/dia.<br>Crianças: 60 mg/kg/dia, de | Frasco para infusão IV de 500 mg ou 1 g |

| | | |
|---|---|---|
| | 8/8 h; dose máxima 6 g/dia. | |
| Nitrofurantoína | Crianças: 5 a 7 mg/kg/dia, de 6/6 h.<br>Profilaxia: 1 a 2,5 mg/kg/dia, 1 a 2 vezes por dia; dose máxima: 100 mg/dia. | Suspensão oral 5 mg/ml<br>Cápsulas 100 mg |
| Oxacilina | RN: 25 a 50 mg/kg/dose, de 6/6 h.<br>Crianças: 100 a 200 mg/kg/dia, de 6/6 h; dose máxima: 12 g/dia. | Frasco-ampola 500 mg |
| Penicilina G Cristalina | Crianças: 100.000 a 300.000 UI/kg/dia ÷ 4-6<br>Dose máxima: 400.000 UI/kg/dia.<br>RN: 50.000 UI ÷ 2 p/14 dias. | Fr. amp. 1.000.000 UI<br>Fr. amp. 5.000.000 UI<br>Fr. amp. 10.000.000 UI |
| Penicilina Benzatina | Crianças com menos de 25 kg: 50.000 UI/kg, dose única.<br>Crianças com mais de 25 kg: 1.200.000 UI em dose única. | Frasco-ampolas de 300.000, 600.000 e 1.200.000 UI |
| Penicilina V | 25.000 a 50.000 UI/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h. | Comprimidos 500.000 UI<br>Suspensão oral: 400.000 UI/5ml |
| Sulfametoxazol + Trimetroprima | Crianças de 5 semanas a 6 meses: 20 mg de TMP/100 mg de SMZ, a cada 12 h; de 6 meses a 5 anos: 40 mg de TMP/200 mg de SMZ, a cada 12 h; de 6 a 12 anos: 80 mg TMP/400 mg SMZ, a cada 12 h; acima de 12 anos: 160 mg de TMP/800 mg de SMZ, a cada 12 horas. Dose média diária: 6 mg de TMP/30 mg de SMZ por kg de peso. | Suspensão oral 200 mg SMZ/5 ml e 40 mg TMP/5ml<br>Suspensão oral 400 mg SMZ/5 ml e 80 mg TMP/5 ml<br>Comprimidos 400 mg SMZ e 80 mg de TMP<br>Comprimidos 800 mg SMZ e 160 mg de TMP<br>Intravenoso 80 mg TMP/400 mg SMZ/5 ml |
| Rifampicina | RN: 10 a 20 mg/kg/dose, de 24/24 h. Profilaxia por contato com doença meningocócica: 5 mg/kg/dose, de 24/24 h, por 2 dias.<br>Profilaxia por contato com doença invasiva por *H. Influenzae* tipo b: 10 mg/kg/dose, de 24/24 h, por 4 dias.<br>Crianças: 10 a 20 mg/kg/dia, 2 vezes, ou 1 vez ao dia.<br>Profilaxia de meningite: 20 mg/kg/dia, por 3 dias (menigocócia: 2 dias; *H. Influenzae*: 4 dias. | Suspensão oral 20 mg/ml<br>Gotas pediátricas: 150 mg/ml (41 gotas)<br>Solução injetável (IV) 50 mg/ml<br>Solução injetável (IM) 250 mg |
| Teicopramina | Crianças – na neuropenia febril: 10 mg/kg/dia, de 2/2 h, por 3 doses; após, utilizar 10 a 20 mg/kg/dia. Infecções por germes oportunistas: 3 a 6 mg/kg/dia. | Solução injetável 200 e 400 mg<br>Frasco-ampola 200 e 400 mg |
| Vancomicina | RN – na meningite: 15 | Frasco-ampola 500 m |

| | | |
|---|---|---|
| | mg/kg/dose; na bacteremia: 10 mg/kg/dose.<br>Crianças: 40 a 60 mg/kg/dia, de 6/6 h. | Frasco 500 mg e 1 g |
| **Anticonvulsivantes** | | |
| Carbamazepina | RN: 5 a 10 mg/kg/dia, de 12/12 h. A dose pode ser aumentada a cada 5 a 7 dias para 10 a 20 mg/kg/dia. Nível sérico terapêutico : 4 a 12 μg/ml.<br>Crianças: 10 a 20 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h. | Comprimidos 200 e 400 mg<br>Suspensão oral a 2%<br>Comprimidos divisíveis de liberação lenta 200 e 400 mg |
| Clonazepam | Crianças menores de 10 anos: 0,01 a 0,03 mg/kg/dia; aumentar até 0,5 mg a cada 3 dias. Dose usual: 0,1 a 0,3 mg/kg/dia, de 8/8 h.<br>Crianças maiores de 10 anos: 0,05 a 0,2 mg/kg/dia, de 8/8 h; dose máxima: 20 mg/dia | Gotas 2,5 mg/ml (1 gota=0,1 mg)<br>Comprimidos 0,5 e 2 mg |
| Diazepam | Via oral: 1 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. Sedação oral / relaxante muscular: 0,12 a 0,8 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 h.<br>Injetável: 0,2 a 0,3 mg/kg/dose, a cada 15 a 30 minutos. | Comprimidos 5 e 10 mg<br>Ampolas 10 mg/2 ml |
| Fenitoína | Via oral: RN em estado epiléptico: dose de manutenção de 4 a 8 mg/kg/dia, de 12/12 h. Nível terapêutico: 10 a 20 μg/ml.<br>Crianças: 5 a 10 mg/kg/dia, de 8/8 h ou 12/12 h.<br>Injetável – RN em estado epiléptico: dose de ataque 15 a 20 mg/kg/dose; dose de manutenção: 4 a 8 mg/kg/dia, de 12/12 h.<br>Crianças: 20 mg/kg; manutenção: 5 a 10 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h; velocidade máxima de infusão: 1 mg/kg/hora. | Suspensão oral 100 mg/5ml<br>Cápsulas e comprimidos 100 mg<br>Ampolas 50 mg/ml |
| Fenobarbital | VO – RN – manutenção da crise convulsiva: 3 a 6 mg/kg/dia, de 12/12 h. Iniciar 12 a 24 h após dose de ataque. Na colestase: 4 a 8 mg/kg/dia, por 4 a 5 dias. Na sedação: 1 a 3 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. Crianças: 4 a 8 mg/kg/dia, de 12/12 h ou 1 vez ao dia.<br>Injetável – RN – dose de ataque: 20 mg/kg/dose; repetir 10 mg/kg/dose por mais 2 vezes se as crises | Comprimidos 50 e 100 mg<br>Ampolas 200 mg/2 ml<br>Gotas 40 mg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| | convulsivas se mantiverem. Na manutenção: 3 a 5 mg/kg/dia, de 12/12 h; iniciar 12 horas após o ataque; dose máxima: 40 mg/kg. Na colestase: 4 a 5 mg/kg/dia, por 4 a 5 dias. Na sedação: 1 a 3 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. Crianças: mal convulsivo – 15 a 20 mg/kg; dose de manutenção: 5 mg/kg/dia; dose máxima 20 mg/kg | |
| Gabapentina | Crianças de 3 a 12 anos: iniciar com 10 a 15 mg/kg/dia, de 8/8 h; dose média: 25 a 40 mg/kg/dia, de 8/8 h. | Cápsulas 300 mg |
| Lamotrigina | Crianças com mais de 17 kg: 2 a 5 mg/kg/dia, de 12/12 h. | Comprimidos 25, 50 e 100 mg |
| Oxcarbazepina | Crianças de 4 a 16 anos: 8 a 10 mg/kg/dia, de 12/12 h; dose máxima: 600 mg/kg/dia. | Comprimidos 300 e 600 mg<br>Suspensão oral a 6%<br>Comprimidos divisíveis de 300 e 600 mg |
| Topiramato | 1 a 3 mg/kg/dia em dose única tomada à noite; dose de manutenção: 5 a 9 mg/kg/dia, de 12/12 h. | Cápsulas de 15 e 25 mg<br>Comprimidos de 25, 50 e 100 mg |
| Valproato sódico | Crianças acima de 6 anos: 10 a 15 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h. | Xarope 250 mg/5 ml<br>Cápsulas 250 mg<br>Comprimidos revestidos 300 e 500 mg<br>Comprimidos de 200 e 500 mg |
| Vigabatrina | 40 a 80 mg/kg/dia, de 12/12 h. | Comprimidos 500 mg |
| **Antieméticos** | | |
| Alizaprida | 5 mg/kg/dia | Gotas 12 mg/ml<br>Comprimidos 50 mg<br>Ampolas 50 mg/2 ml |
| Bromoprida | Via Oral: 0,5 a 1 mg (3 a 6 gotas/kg/dia), de 6/6 ou 8/8 h.<br>Injetável: 0,5 a 1 mg/kg/dia. | Gotas 4 mg/ml<br>Solução oral 1 mg/ml<br>Cápsulas 10 mg<br>Comprimidos 10 mg |
| Clorpromazina | Crianças maiores de 2 anos: 1 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 h; dose diária não deve exceder 40 mg em crianças menores de 5 anos e 75 mg em maiores de 5 anos. | Comprimidos 25 e 100 mg<br>Ampolas 25 mg/5 ml<br>Gotas 1 gota/1mg |
| Dimenidrato | Dramin sol. Oral – 0,5 ml/kg, de 6/6 ou 8/8 h.<br>Dramin B6 sol. Oral (gotas) – crianças acima de 2 anos: 1,25 mg/kg (1 gota/kg) a cada 6 a 8 h.<br>Dramin B6 comprimidos revestidos – crianças acima de 6 a 12 anos: 25 a 50 (1/2 a 1 comprimido), de 6/6 a 8/8 h. | Sol. Oral 12,5 mg/5ml<br>Comprimidos 50 e 100 mg<br>Gotas 25 mg/ml<br>Ampolas 50 mg (IM)<br>Ampolas 30 mg/10 ml (IV) |

| | | |
|---|---|---|
| | Dramin B6 sol. Injetável – Crianças acima de 2 anos: 1,25 mg/kg, de 6/6 h.<br>Dramin B6DL: 1,25 mg/kg, até 4 vezes ao dia. | |
| Domperidona | 0,25 a 0,5 mg/kg/dose, de 8/8 h. | Suspensão 1 mg/ml<br>Comprimidos 10 mg |
| Granisetrona | Crianças acima de 2 anos: 10 a 20 mg/kg, 15 a 60 minutos antes da quimioterapia. | Ampolas 1 mg/ml |
| Metoclopramida | Injetável – RN: 0,033 a 0,1 mg/kg/dose, IM ou IV, de 8/8 h; crianças: 0,1 mg IM ou IV, ate de 6/6 h; dose máxima: 0,8 mg/kg/dia.<br>Via Oral – RN: 0,033 a 0,1 mg/kg/dose, de 8/8 h; crianças: 0,1 a 0,2 mg/kg, até de 6/6 h; dose máxima: 0,8 mg/kg/dia.<br>Via retal: 0,1 mg/kg; dose máxima: 10 mg, 4 x/dia. | Comprimidos 10 mg<br>Gotas pediátricas 4 mg/ml<br>Supositórios 5 e 10 mg<br>Solução injetável 10 mg/2 ml<br>Solução oral 5 mg/5 ml<br>Injetável 10 mg/2 ml |
| Ondansetrona | Crianças de 2 a 11 anos e com menos de 40 kg – nas náuseas e vômitos de pós-operatório: 0,1 mg/kg, via oral, 1 h antes da cirurgia.<br>Crianças de 2 a 11 anos e com mais de 40 kg – nas náuseas e vômitos de pós-operatório: 4 mg, via oral, 1 h antes da cirurgia.<br>Crianças de 4 a 11 anos – quimioterapia emetogênica: 4 mg, VO, de 8/8 h, a primeira dose ½ hora antes do tratamento e, a seguir, 4 e 8 horas após a primeira dose.<br>Injetável – crianças acima de 4 anos – quimioterapia e radioterapia emetogênica: dose única de 5 mg/m$^2$, durante 15 min.<br>Imediatamente antes da terapia; vômitos de outra causa: 0,1 mg/kg. | Comprimidos 8 mg<br>Ampolas 4 e 8 mg |
| Antiespasmódicos | | |
| Dicicloverina | Lactentes: 5 mg, de 6/6 ou 8/8 h; crianças: 10 mg, de 6/6 ou 8/8 h. | Frascos com 20 mg/ml |
| Dimeticona | Lactentes: 4 a 6 gotas, 3 x/dia<br>Até 12 anos: 6 a 12 gotas, 3 x/dia<br>Acima de 12 anos: 16 gotas, 3 x/dia (total de 48 gotas ao dia) | Emulsão oral 75 mg/ml<br>Comprimidos 40 mg<br>Gotas 75 mg/ml |
| Escopolamina | VO: 0,5 mg ( 1 gota)/kg, de 6/6 ou 8/8 h; dose máxima 10 | Gotas 10 mg/ml<br>Drágeas 10 mg |

| | | |
|---|---|---|
| | mg. Para crianças em idade escolar e adultos: 15 mg (30 gotas), de 6/6 ou 8/8 h.<br>Injetável: 0,5 mg/kg/dose, de 6/6 ou 8/8 h. | Ampolas 20 mg/ml |
| Hioscina | VO – lactentes: 10 gotas/dose, de 8/8 h.<br>Crianças acima de 1 ano: 10 a 20 gotas/dose, de 8/8 h.<br>Crianças em idade escolar: 30 gotas/dose, de 6/6 ou 8/8 h.<br>Via SC, IM ou IV – lactentes e crianças pequenas: ¼ ampola, via SC ou IM. Crianças em idade escolar: 1 ampola, IM ou IV. | Injetável 20 mg |
| **Antifúngicos sistêmicos** | | |
| Anfotericina B | RN: 0,25 a 0,5 mg/kg; dose de manutenção: 0,5 a 1 mg/kg, a cada 24 h.<br>Crianças: dose teste: 0,1 mg/kg/dose; dose usual: 0,3 a 1 mg/kg/dia<br>Para a anfotericina B lipossomal – neonatos: começar com 1 mg/kg/dose e aumentar diariamente 1 mg/kg; dose inicial: 1 a 5 mg/kg/dose, a cada 24 h.<br>Crianças: 2,5 a 5 mg/kg/dia. | Frasco com 100 mg<br>Frasco com 50 mg de pó para infusão intravenosa<br>Injetável 50 mg |
| Cetoconazol | Crianças até 20 kg: 50 mg, de 24/24 h; de 20 – 40 kg: 100 mg, de 24/24 h; acima de 40 kg: 200 mg, de 24/24 h. | Comprimidos de 200 mg |
| Fluconazol | VO: 3 a 6 mg/kg/dose, dose única.<br>Injetável: RN – infecção sistêmicas, incluindo meningite: 12 mg/kg; dose de manutenção: 6 mg/kg/dose.<br>Crianças na criptococose meníngea: 12 mg/kg, dose única; dose usual: 3 a 6 mg/kg/dia, dose única. | Cápsulas 50, 100 e 150 mg<br>Frasco-ampola 200 mg/100 ml<br>Solução injetável (bolsa plástica) 2 mg/ml |
| Griseofulvina | Crianças: 10 mg/kg/dia, dose única ou fracionada, após as refeições. | Comprimidos 500 mg |
| Nistatina | Prematuros e crianças de baixo peso: 100.000 UI, de 6/6 h.<br>Lactentes: 100.000 a 200.000 UI, de 6/6 h. Crianças maiores: 100.000 a 600.000 UI, de 6/6 h. | Suspensão oral 100.000 UI/ml |
| Terbinafina | Crianças com menos de 20 kg: 62,5 mg/dia; entre 20 e 40 kg: 125 mg/dia; acima de 40 kg: 250 mg/dia. | Comprimidos 125 e 250 mg |
| **Anti-helmínticos** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Albendazol | Ancilostomíase, ascaridíase, enterobíase: 400 mg/dia, dose única.<br>Estrogiloidíase, teníase, tricocefalíase: 400 mg, dose única diária, por 3 dias. | Suspensão oral 400 mg/10 ml<br>Comprimidos mastigáveis 400 mg |
| Cambendazol | Estrogiloidíase: 5 mg/kg, dose única; repetir tratamento após 10 dias. | Comprimidos 180 mg<br>Suspensão 6 mg/ml |
| Cambendazol + mebendazol | Ancilostomíase, estrongiloidíase, teníase, tricocefalíase: 5 mg/kg em dose única; repetir após 10 dias. | Suspensão oral 150 mg (cambendazol) + 400 mg (mebendazol)/30 ml<br>Comprimidos 75 mg (cambendazol) + 20 mg (mebendazol) |
| Ivermectina | Estrongiloidíase: 200 µg/kg, dose única, repetir em 2 a 3 semanas. | Comprimidos 6 mg |
| Levamisol | Ascaridíase:<br>Menores de 1 ano: 40 mg; de 1 a 7 anos: 80 mg; acima de 7 anos: 150 mg. | Comprimidos de 80 e 150 mg |
| Mebendazol | Suspensão oral: no tratamento da ascaridíase, oxiuríase, ancilostomíase, tricocefalíase e infestações mistas – 5 ml, 2 x/dia, durante 3 a 4 dias, independente do peso; No tratamento da teníase: 10 ml, 2 vezes/dia, durante 3 a 4 dias, independente do peso.<br>Cápsulas: ascaridíase, oxiuríase, ancilostomíase, tricocefalíase e infecções mistas – 1 cápsula, 2 x/dia, 3 a 4 dias; Na teníase: 2 cápsulas, 2 x/dia, 3 a 4 x/dia, independente do peso. | Suspensão oral 100 mg/5 ml<br>Comprimidos 100 mg |
| Oxamniquina | Esquistossomíase: Crianças até 15 anos: 20 mg/kg, dose única.<br>Adultos: 15 mg/kg, dose única | |
| Pirantel, Pamoato | Ancilostomíase: 10 mg/kg, por 3 dias consecutivos; ascaridíase: 10 mg/kg, única tomada; máximo – 1 g; repetir após 1 mês, se necessário. | Suspensão oral 250 mg/15 ml<br>Comprimidos 250 mg |
| Pirvínio, Pamoato | Enterobíase: 10 mg/kg dose única; repetir após 15 a 20 dias. | Suspensão oral 10 mg/ml<br>Drágeas 100 mg |
| Praziquantel | Esquistossomíase: Crianças até 15 anos: 20 mg/kg, dose única.<br>Adultos: 15 mg/kg, dose única | Comprimidos:<br>Cestox 150 mg<br>Cisticid 500 mg |
| Tiabendazol | Estrongiloidíase: Crianças: 25 mg/kg, de 12/12 h, por 2 a 3 dias.<br>Adultos: 500 mg, de 12/12 h, por 5 dias. | |

| Anti-histamínicos | | |
|---|---|---|
| Cetirizina | De 2 a 6 anos: 2,5 ml, pela manhã e à noite; de 6 a 12 anos: 5 ml, pela manhã e à noite: acima de 12 anos: 10 ml ou 1 comprimido 1 vez ao dia. | Solução oral 1 mg/ml<br>Comprimidos 10 mg<br>Gotas 10 mg/ml |
| Cimetidina | De 20 a 40 mg/kg/dia, de 6/6 ou 12/12 h. | Comprimidos 200, 400 e 800 mg<br>Solução injetável 300 mg<br>Solução oral 200 mg/5 ml |
| Clemastina, Fumarato | Crianças até 1 ano: 0,125 mg/dose, de 12/12 h; 1 a 3 anos: 0,125 a 0,150 mg/dose, de 12/12 h; 3 a 6 anos: 3 a 6 anos: 0,250 mg/dose, de 12/12 h; 6 a 12 anos: 0,375 mg/dose, de 12/12 h; maiores de 12 anos: 0,75 a 1 mg/dose, de 12/12 h. | Comprimidos 1 mg<br>Xarope 0,75 mg/15 ml |
| Desloratadina | De 1 a 5 anos: 2,5 ml, 1 x/dia; de 6 a 11 anso: 5 ml, 1 x/dia; acima de 12 anos: 10 ml, 1 x/dia. | Comprimidos 5 mg<br>Xarope 0,5 mg/ml |
| Dextroclorfeniramina, Maleato | Crianças menores de 12 anos: 0,15 mg/kg, subdivididos em 4 doses; acima de 12 anos: 1 comprimido ou 5 ml de 6/6 ou 8/8 h. | Suspensão oral 2 mg/5 ml<br>Comprimidos 2 mg<br>Drágea 6 mg |
| Ebastina | Crianças de 2 a 6 anos: 2,5 ml, 1 vez/dia; de 6 a 12 anos: 5 ml, 1 vez/dia; acima de 12 anos e adultos: 1 comprimido (10 mg), 1 vez/dia. | Xarope 1 mg/ml<br>Comprimidos 10 mg |
| Epinastina, Cloridrato | Crianças de 6 a 12 anos: 5 a 10 mg, 1 x/dia; acima de 12 anos: 10 mg/dia. | Xarope 10 mg/5 ml<br>Comprimidos 10 a 20 mg |
| Fexofenadina, Cloridrato | Rinite alérgica: crianças de 6 a 12 anos – 30 mg, de 12/12 h; crianças acima de 12 anos e adultos – 60 mg, de 12/12 h ou 120 mg, 1 x/dia;<br>Na urticária: crianças de 6 a 12 anos – 30 mg, de 12/12 h; crianças acima de 12 anos e adultos – 180 mg, 1 x/dia. | Comprimidos de 60, 120 e 180 mg<br>Cápsulas de 60 mg |
| Hidroxizina, Cloridrato | Crianças: 0,7 mg/kg de peso 3 x/dia.<br>Adultos: 1 comprimido (25 mg), 3 a 4 vezes ao dia. | Xarope e solução oral com 2 mg/ml<br>Comprimidos sulcados 25 mg<br>Comprimidos 10 mg<br>Cápsulas 25 mg |
| Levocabastina, Cloridrato | Crianças acima de 6 anos: 0,54 mg/ml ( 1 dose de *spray*) em cada narina, de 12/12 h. | *Spray* nasal 0,54 mg/ml |
| Loratadina | Crianças de 2 a 6 anos: 5 mg, 1x/dia.<br>Crianças acima de 6 anos: 10 mg 1 x/dia. | Xarope 1 mg/ml<br>Comprimidos 10 mg |
| Pimetixeno | Crianças menos de 1 ano: 1 | Gotas 1 mg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| | gota/kg, de 8/8 h; de 1 a 5 anos: 5 a 7,5 ml de 8/8 h; 5 a 10 anos: 7,5 a 10 ml, de 8/8 h; acima de 10 anos: 10 a 15 ml, de 8/8 h. | Xarope 0,5 mg/5 ml |
| Prometazina, Hidrocloreto | Crianças: 0,1 mg/kg/dose x 4<br>Ou até 1 mg/kg/dose, sendo 0,5 mg/kg/dose ao deitar e 0,15 mg/kg/dose de 6/6 h durante o dia.<br>Antiemético: 0,25-1,0 mg/dose x 4 | Compr. 25 mg<br>Sol. Injetável 25 mg/ml |
| Ranitidina | VO – neonatos: 2 mg/kg/dose, de 8/8 h; crianças: 4 a 5 mg/kg/dia ÷ 2 a 3 x.<br>Via parenteral – neonatos: 0,5: mg/kg/dose, 2 x/dia; infusão contínua IV: 0,04 a 0,08 mg/kg/h; crianças: 2 a 4 mg/kg/dia ÷ 2 a 4 x; infusão contínua IV: 0,08 a 0,17 mg/kg/h. | Comp. 150 mg<br>Ampolas 50 mg/2 ml<br>Sol. oral 15 mg/ml |
| **Antiparasitários** | | |
| Etofamida | Amebicida – adultos: 2 comp./dia durante 3 dias | Comp. 500 mg |
| Cloroquina | Antimalárico – VO: dose inicial de 10 mg/kg, seguir com 5 mg/kg, 6, 24, e 48 h após a dose inicial;<br>Via IM: 2 a 3 mg/kg. Pode-se repetir após 6 horas.<br>Uso profilático (via oral): menores de 1 ano – 37,5 mg/semana; de 1 a 3 anos – 75 mg/semana; de 4 a 6 anos – 100 mg/semana; de 7 a 10 anos – 150 mg/semana; de 11 a 16 anos – 225 mg/semana. Deve ser tomado 2 semanas antes e durante 6 a 8 semanas após visita à área de malária. | Comprimidos 100 e 250 mg<br>Ampolas 150 mg/3 ml |
| Espiramicina | Antitoxoplásmicos:<br>100 mg/kg/dose, de 6/6 h, máximo 3 g/dia. | Comprimidos 500 mg |
| Furazolidona | Giardíase: 5 a 8 mg/kg/dia ÷ 2-4x por 7 a 10 dias.<br>Até 6 anos: 50 mg x 2<br>De 7 a 12 anos: 100 mg x 2<br>Adultos: 200 mg/dose x 2 ou 7 a 10 mg/kg/dia ÷ 3-4 (10 dias). | Suspensão 50 mg/5 ml<br>Comp. 200 mg |
| Hidroxicloroquina | Antimalárico: 8 mg/kg/semana; não ultrapassar 400 mg/semana. | Comp 400 mg |
| Metronidazol | Amebicida: 20 mg/kg/dia ÷ 3, por 10 dias.<br>Giardicida: 35 a 50 mg/kg/dia por 10 dias. | Susp pediátrica 40 mg/ml<br>Injet. 500 mg (frasco com 100 ml e bolsa plástica 100 ml).<br>Comp 250 e 400 mg |

| | | |
|---|---|---|
| Nimorazol (Nitrimidazina) | Giardicida: 15 a 20 mg/kg/dia, ÷ 2-3x, durante 5 a 7 dias. | Comp 500 mg<br>Xarope 250 mg/10ml |
| Pirimetamina | Antimalárico:<br>Crianças: 2 mg/kg/dia ÷ (máximo 25 mg/dia) por 2 dias RN) ou 3 dias (crianças) e depois 1 mg/kg/dia por 4 semanas ( assoc. à sulfadiazina e ác. folínico).<br>Na profilaxia, preferir outras drogas.<br>Toxoplasmose (imunocompetentes): 100 mg/dia nos 3 primeiros dias e depois 25 mg/dia (assoc. Sulfadiazina: 1g/dia ÷ 4 e ác. Folínico: 15 mg/dia/ 4 semanas.<br>Isosporíase ( supressão prolongada na AIDS): 25 mg/kg (assoc. a ac. folínico: 15 mg/dia. | Comprimidos de 25 mg |
| Secnidazol | Amebíase intestinal, giardíase e tricomoníase: 30 mg/kg/dia (máximo de 2 g) em dose única.<br>Amebíase hepática: 1.500 mg/dia ÷ 3 (por 5 -7 dias). | Comp 500 e 1.000 g<br>Suspensão 150 mg/5 ml |
| Teclosan | Amebíase – crianças e < 40 kg: 7,5 mg/kg/dia ÷ 3 a 5 dias ou até 40 kg: 20 mg (2 ml) 3x/dia; acima de 40 kg: 100 mg/dose 3 x/dia. | Comp 100 e 500 mg<br>Suspensão 10 mg/ml |
| Tinidazol | Amebíase – crianças: 25 a 45 mg/kg em dose única/dia por 2 dias.<br>Giardíase: -crianças: 50 a 60 mg/kg/dia ÷ 2 por 5 dias.<br>Adultos: 50 mg/kg, dose única, por 3 dias. | Comprimodos 500 mg |
| **Escabicidas / Pediculicida** | | |
| Benzoato de Benzila | Aplicar em todo corpo, do pescoço para baixo, após o banho; remover com novo banho no dia seguinte. Repetir 3 x em dias alternados. | Líquido e sabonete |
| Deltametrina | Aplicar por 4 dias, repetindo após 7 dias. | Shampoo, loção e sabonete |
| Ivermectina | 200 µg/kg, dose única, repetir em 2 a 3 semanas. | Comprimidos 6 mg |
| Monossulfiram | Espalhar a solução diluída 1:1 ou 1:2 com água em todo o corpo após o banho. Usar 2 noites seguidas e repetir após 7 dias. | Loção a 25% e sabonete a 5% |
| **Atitussígenos e Mucolíticos** | | |
| Acetilcisteína | VO: 15 mg/kg/dia ÷ 3<br>Via inalatória: 150 mg, diluído em igual volume de soro | Envelope c/ grânulos 200 mg<br>Xarope inf. 20 mg/ml<br>Sol. injetável 100 mg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| | fisiológico, 1 a 2 vezes ao dia.<br>Intoxicação por acetoaminofeno: dose inicial 140 mg/kg, por infusão intravenosa,; dose de manutenção: 140 mg/kg, por infusão, a cada 4 horas, até completar 17 doses. | Ampolas para inalação |
| Ambroxol | Até 2 anos: 7,5 mg 2x<br>De 2 a 5 anos: 7,5 mg 3x<br>Acima de 5 anos: 15 mg 3x | Xarope pediátrico 15 mg/ml<br>Xarope adulto 6 mg/ml<br>Gotas 7,5 mg/ml = 20 gotas<br>Comprimidos 30 mg<br>Sol. oral 7,5 mg/ml |
| Bromexina | < 2 anos: 1 mg 3x<br>De 2 a 5 anos: 7,5 mg 3 x<br>Acima de 6 anos: 15 mg 3x | Gotas: 2 mg/ml<br>Xpe infantil: 4 mg/5 ml<br>Xpe adulto: 8 mg/5 ml |
| Carbocisteína | 1 a 5 anos: 5 mg/kg/dose 3x<br>5 a 12 anos: 100 a 200 mg/dose 3x | Xpe adulto: 250 mg/ 5 ml<br>Xpe ped: 100 mg/5 ml<br>Gotas: 50 mg/ml |
| Clobutinol | Crianças: 1,8 a 2,4 mg/kg/dose x 3<br>Adultos: 40 – 80 mg x 3 | Xarope: 20 mg/5 ml<br>Gotas: 60 mg/ml |
| Cloperastina | Crianças: 1 a 2 mg/kg/dia ÷ 3<br>Adultos: 30 mg à noite e 15 mg pela manhã | Xarope 10 mg/5 ml<br>Gotas 0,8 mg/gota |
| Codeína | 0,5 a 1 mg/kg/dose, de 6/6 h, dose máxima 60 mg/dose. | Sol. oral 3 mg/ml<br>Comprimidos 30 e 60 mg |
| Dextrometorfano, Bromidrato | Crianças de 6 a 12 anos: 1 colher de chá ou 1 pastilha, de 4/4 h; Acima de 12 anos e adultos: 2 colheres de chá, ou 2 pastilhas, de 4/4 h. | Xarope 5m/ml<br>Pastilhas 5 mg |
| Dropopizina | 0,45 mg/kg/dose x 3-4 | Xarope pediátrico 6,5 mg/5 ml<br>Xarope adulto 15 mg/5 ml<br>Gotas 30 mg/ml |
| Erdosteína | 2-4 anos: 87,5 a 175 mg/dose x 2 = 2,5 a 5 ml da suspensão/dose x 2 | Suspensão 175 mg/5 ml<br>Sachê 225 mg<br>Cápsulas 300 mg |
| Lovodropropizina | Acima de 2 anos: 1 mg/kg/dose x 3 | Gotas 30 mg/ml<br>Xarope 30 mg/5 ml |
| Pipazetato | Lactentes: 5-8 mg/kg/dose x 2<br>Crianças: 15-25 mg/dose x 2-3 | Gotas 40 mg/25 gotas<br>Xarope 10 mg/5 ml |
| Sobrerol | Abaixo de 2 anos: 40 mg x 2<br>Acima de 2 anos: 80 mg x 2 | Xarope 40 mg/5 ml<br>Supositórios 100 mg |
| **Antiviróticos** | | |
| Aciclovir | Herpes em imunodeprimidos, herpes neonatal, encefalite por herpes:<br>Qualquer idade: IV (correr em 60 min): 250-500 mg/m$^2$/dose) x 3. Iniciar o mais precoce possível, até 96 horas depois de instalada a doença. Manter 14 dias.<br>RN e lactente: 10-2- mg/kg/dose x 3 / 14 dias<br>Herpes simples neonatal: | Frasco-ampola 250 mg<br>Comprimidos 200 e 400 mg<br>Creme a 5%<br>Pomada oftálmica a 5% |

| | | |
|---|---|---|
| | RBPT: 20 mg/kg/dia IV ÷ 2-3 x por 14-21 dias.<br>RNT: 30-50 mg/kg/dia IV ÷ 2-3 dias por 14-21 dias.<br>Varicela ou Zooster em imunodeprimidos: IV: 30 mg/kg ÷ 2-3 por 7-10 dias.<br>VO: 250-600 mg/m$^2$/dose/4-5<br>Varicela em imunocopententes: 80 mg/kg/dia ÷ 4, VO, iniciado até 48 h após as primeiras lesões, por 4 a 6 dias.<br>Profilaxia de varicela em imunossuprimidos: 40 mg/kg/dia ÷ 4 VO do 9º a 14º dia do contato.<br>Profilaxia para CMV em imunossuprimidos: VO: 80 mg/kg/dia ÷ 4, durante o período; IV: 1.500 mg/m$^2$/dia ÷ 3 por todo o período.<br>Herpes-zooster: Até 1 ano: 10 mg/kg/dose x 3 – IV<br>Acima de 1 ano: 1.500 mg/m$^2$/dia ÷ 3 iv. | |
| Amantadina | Crianças de 1-9 anos: 4-6 mg/kg/dia ÷ 1-2 (máximo de 150 mg/dia); crianças de 9-12 anos: 200 mg/dia x 2. | Comprimidos 100 mg |
| Didanosina | Dose média recomendada: 120 mg/m$^2$, de 12/12 horas. | Solução oral 4 g<br>Comrimidos 25, 100 e 200 mg |
| **Broncodilatadores** | | |
| Acebrofilina | 2 mg/kg/dia, de 11/12 h | Xarope inf. 25 mg/5ml |
| Aminofilina | Oral: 4mg/kg/dose x 4<br>Dose máxima: 6 mg/kg/dose<br>IV: 3-5 mg/kg/dose x 4 (cada dose em 15-20 min) | Comprimidos 100 e 200 mg<br>Ampolas 24 mg/ml<br>Gotas 240 mg/ml |
| Brometo de Ipratrópio | Sol. para inalação:<br>Menores de 5 anos: 0,05-0,125 mg/4-10 gotas, 4 a 6 x/dia;<br>Maiores de 5 anos: 0,135-0,250/10-20 gotas 4 a 6x/dia | Sol. p/ inalação a 0,250 mg<br>*Spray* 0,02 mg/dose |
| Epinefrina | Crianças: IV: 0,01 mg/kg ou 0,1 ml/kg da solução diluída para 1:10.000 ( 1 amp/9 ml SF 0,9%)<br>No RN (sala de parto) 0,1 a 0,3 ml/dose na diluição 1:10.000 (0,01 a 0,03 mg/kg)<br>Choque anafilático: precoce: 0,3 a 0,5 ml SC-IM; choque avançado: 0,1 ml/kg (não diluída) IV-IM-IO-ET<br>Infusão contínua: Dose baixa: 0,05 a 0,3 µg/kg/min; dose alta: 0,3 a 2,0 µg/kg/min. | Ampola (1 ml) 1 mg (1/1.000) |
| Fenoterol | VO: 0,25 mg/kg/dose, de 8/8 | Gotas: 1 gota = 0,25 mg |

| | | |
|---|---|---|
| | h; dose máxima 5 mg/dose.<br>Via inalatória: Crianças com menos de 25 kg: 0,25 mg (1 gota)/3 kg, diluídos em 3 a 5 ml de SF, 3 a 6 x/dia. Crianças com mais de 25 kg: 2 a 2,5 mg (8 a 10 gotas) diluídos em 3 a 5 ml de SF, 3 x/dia. | Xarope pediátrico 2,5 mg/10 ml<br>Solução 1 ml = 20 gotas = 5 mg<br>Comprimidos 2,5 mg<br>Spray 100 e 200 µg/dose<br>Solução oral 5 mg/ml |
| Formoterol, Fumarato | Crianças (sobretudo acima de 12 anos): 12 µg ( 1 jato ou cápsula)/dose x 2 (pode repetir a primeira dose até 3x).<br>Adultos: 12 a 24 µg ( 1 a 2 jatos ou cápsulas)/dose x 2 | Caps. Com inalador: 12 µg<br>*Spray* turbuhaler 6 µg/jato<br>*Spray* turbuhaler 12 µg/jato |
| Salbutamol | Oral: 1 a 2 mg, 3 a 4 x/dia<br>*Spray* – 100 a 200 µg/dose, 3-4 x/dia.<br>Pó para inalação – 1 inalação por dia.<br>Nebulização – 0,25 a 1 ml, diluído para 2 ml de soro fisiológico; usar sob máscara facial por 10 min;<br>Injetável – na crise: 10 µg/kg (média: 300 a 400 µg), a cada 4 horas. | Xarope 2 mg/5 ml<br>Comprimidos 2 e 4 mg<br>*Spray* 100 µg/dose<br>Solução oral (edulito) 2 mg/5 ml<br>Solução para nebulização 5 mg/ml<br>Injetável 500 µg/ml<br>Pó para inalação 200 µg |
| Salmoterol | Crianças maiores de 4 anos e adultos: spray: 2 aplicações (50 µg), 2 x/dia; aerossol de pó seco: 50 µg, 2 x/dia. | *Spray* 50 µg/dose<br>*Disk-haler* 50 µg/dose |
| Teofilina | Na asma: 10 a 20 mg/kg/dia, de 12/12 horas. | Cápsulas 100, 200 e 300 mg |
| Terbutalina | Crianças:<br>Oral: 0,05 a 0,075 mg/kg/dose x3 ou 0,25 ml do xarope/kg/dose.<br>Nebulização: 1 gota/3 kg/dose x 4 a 12 (máximo de 10 gotas/dose).<br>SC: 0,005 a 0,01 mg/kg/dose x 2 com intervalo de 15-20 minutos por até 3 doses. | Xarope 1,5 mg/5 ml<br>Comprimidos 2,5 mg<br>Ampolas 0,5 mg/ml |
| **Digitálicos** | | |
| Digoxina | Dose de digitalização, VO:<br>RNPT: 10-20 µg/kg<br>RN termo: 25-35 µg/kg<br>Lactentes: 40-50 µg/kg<br>Pré-escolar: 30-40 µg/kg<br>Escolares: 20-40 µg/kg<br>Adolescentes: 10-15 µg/kg<br>Dose de manutenção: ¼ da dose de digitalização.<br>Via IV: 60-75% da dose oral. | Comprimidos 0,25 mg<br>Elixir pediátrico 1 ml/0,05 mg<br>Solução oral 1 ml/0,5 mg |
| Lanatosídio C | Dose de digitalização:<br>RNPT: 10-20 µg/kg<br>RN a termo: 20-40 µg/kg<br>Lactentes: 20-40 µg/kg | Ampolas 0,4 mg/2 ml |

| | | |
|---|---|---|
| | Pré-escolares: 20-40 µg/kg<br>Escolares: 10-20 µg/kg<br>Maiores de 12 anos: 10 µg/kg<br>Manutenção: ¼ da digitalização. | |
| **Diuréticos** | | |
| Clortalidona | 1 a 2 mg/kg/dia, 1 x/dia. | Comprimidos 12,5, 25 e 50 mg |
| Hidroclorotiazida | Neonatos: 2-5 ng/kg/dia, de 12/12 horas.<br>Crianças: 1,5 a 3 mg/kg/dia, de 6/6 ou 12/12 h. | Comprimidos 25 e 50 mg |
| Furosemida | Crianças:<br>1 a 2 mg/lg/dose x 1 a 4 ou 1 a 6 mg/kg/dia ÷ 1-4 doses | Ampolas 20 mg/2 ml<br>Comprimidos 40 mg |
| Espironolactona | Neonatos: 1 a 3 mg/kg/dia ÷ 1 a 2 x/dia.<br>Crianças: 1,5 a 3 mg/kg/dia ÷ 2 ou 4 x/dia | Comprimidos 25, 50 e 100 mg |
| Manitol | Na anúria, na oligúria: dose inicial de 0,5 a 1 g/kg/dose; dose de manutenção: 0,25 g/kg/dose, de 4/4 ou 6/6 h.<br>No edema cerebral: 0,25 g/kg/dose, podendo aumentar até 1 g/kg/dose aplicado até a cada 2 horas se necessário. | Frasco 250 ml a 20% |
| **Hormônios** | | |
| Somatropina – Hormônio do Crescimento | 0,025 a 0,035 mg/kg/dia (crianças deficientes); 0,045 a 0,050 mg/kg/dia (Sind. de Turner) e 0,15 a 0,30 mg/kg/dia (adultos deficientes). Dose semanal dividida entre 6 a 7 injeções. | Via de administração SC:<br>Fresco-ampolas com 5,3 mg (16 UI) e 12 mg (36 UI) com caneta aplicadora.<br>Frasco-ampola 4 UI |
| Leuprolida, Acetato | Crianças – na puberdade precoce: 0,15 a 0,3 mg/kg/dia, a cada 28 dias. | Via IM: Frasco com 11,25 e 22,5 mg com diluente + seringa + agulha. |
| Beclometasona | Via nasal: acima de 6 anos – 50 µg em cada narina, até de 6/6 h.<br>VO: 6 a 12 anos – 50 a 100 µg, até de 6/6 h. | Spray 50 µg/dose (200 doses)<br>Susp. para aerossolterapia flaconete monodose 2 ml<br>Susp. para instilação nasal |
| Betametasona | VO: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia;<br>Via IM: 0,017 a 0,25 mg/kg/dia;<br>As doses posológicas são variáveis e individualizadas segundo a doença e gravidade. | Elixir 0,1 mg/ml<br>Comprimidos 0,5 e 2 mg<br>Gotas 0,5 mg/ml<br>Ampolas 4 mg/ml |
| Budesonida | Profilático da asma brônquica:<br>Novopulmon Novolizer – 1 inalação, 1 a 2 x/dia.<br>Pulmicort Turbuhalar – 100 a 800 µg/dia<br>Profilático da rinite alérgica:<br>Rinites – acima de 6 anos e adultos: dose inicial de 256 µg/dia (2 aplicações de 64 µg ou 4 aplicações de 32 µg em | Pó para inalação 200 µg/dose<br>Susp. p/ inalação 0,25 e 0,5 mg/ml<br>Pó seco para inalação 100 e 200 µg/dose<br>Suspensão de *spray* nasal de 32 µg/dose ou 64 µg/dose<br>Frascos com 120 doses |

| | | |
|---|---|---|
| | cada narina; 1 a 2 x/dia. | |
| Deflazacorte | 1 a 3 mg/kg/dia, de 8/8 h | Gotas 22,75 mg/ml<br>Comprimidos 6 e 30 mg |
| Dexametasona | VO: 2 mg/kg/dia, de 6/6 ou 8/8 horas.<br>Via parenteral: Neonatos – na extubação: 0,1 a 0,25 mg/kg/dose, de 6/6 h; iniciar 24 h antes da extubação e continuar com 3 a 4 doses pós-extubação.<br>Na displasia broncopulmonar (IV): 0,6 mg/kg/dia, de 12/12 h, por 3 dias. A seguir, 0,2 mg/kg/dia, de 12/12 h por 3 dias, diminuindo a dose em 0,1 mg/kg/dia, de 72/72 h, até alcançar 0,1 mg/kg/dia.<br>Crianças: 0,08 a 0,3 mg/kg/dia, de 6/6 ou 12/12h. | Comprimidos 0,5, 0,75 e 4 mg<br>Elixir 0,5 mg/5 ml<br>Ampolas 2 mg<br>Frasco-ampola 4 mg<br>Frasco-ampola 8 mg/ml |
| Fluticasona, Propionato | Crianças de 2 a 4 anos: 1 dose em cada narina 1 x/dia; acima de 12 anos: 2 doses em cada narina, 1 x/dia. | *Spray* nasal aquoso 27,5 µg<br>*Spray* nasal aquoso 50 µg |
| Hidrocortisona | Neonatos – na hipoglicemia: 10 mg/kg/dia, de 12/12 h.<br>Crianças: 1 a 5 mg/kg/dia, em IV, de 6/6 ou 12/12 h. | Frasco-ampola 100 e 500 mg |
| Metilprednisolona | 0,5 mg/kg a cada 24 horas<br>Via parenteral: 0,5 a 1 mg/kg, IM, 1 x/dia; ou 0,5 a 1,7 mg/kg/dia, IV, de 6/6 ou 12/12 h.<br>Na crise de asma – dose de ataque: 2 mg/kg, IV; Manutenção: 2,5 a 1 mg/kg/dose, IV, de 6/6 horas. | Comprimidos 4 mg<br>Pó liofilizado de 40 mg/1 ml, 125 mg/2 ml e 500 mg/8 ml |
| Prednisolona | Neonatos: 0,5 a 1 mg/kg/dia, de 12/12 h.<br>Crianças: 1 a 2 mg/kg/dia, de 12/12 horas | Solução oral de 1 mg/ml, 3 mg/ml e comprimidos 5 e 20 mg |
| Prednisona | Crianças – como imunossupressor: 0,05 a 2 mg/kg/dia, 1 a 4 x/dia;<br>No tratamento da asma: 1 a 2 mg/kg/dia; dose máxima 60 mg/dia. | Comprimidos 5 e 20 mg |
| Hormônio Tireoidiano (Levotiroxina sódica) | VO – Neonatos: 10 a 14 µg/kg/dia, 1 x/dia; crianças de 0 a 6 meses; 8 a 10 µg/kg, 1 x/dia; de 6 a 12 meses: 6 a 8 µg/dia, 1 x/dia; de 1 a 5 anos: 5 a 6 µg/dia, 1 x/dia; de 6 a 12 anos: 4 a 5 µg/kg, 1 x/dia; acima de 12 anos: 2 a 3 µg/kg, 1 x/dia.<br>Injetável – neonatos: 5 a 8 µg/kg/dose, 1 x/dia; crianças: 10 a 15 µg/kg, 1 x/dia. | Comprimidos 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 150, 175 e 200 µg.<br>Frasco-ampola 0,5 mg/5 mg. |

| | | |
|---|---|---|
| **Profiláticos da asma brônquica** | | |
| Bambuterol, Cloridrato | Crianças de 2 a 5 anos: 5 a 10 mg/dia, 1 x/dia.<br>Crianças > 6 anos e adultos: iniciar com 10 mg/dia, 1 x/dia, e aumentar, se necessário, para 20 mg/dia. | Solução oral 1 mg/ml |
| Beclometasona | Vide hormônios | |
| Budesonida | Vide hormônios | |
| Cetotifeno | Crianças 6 meses a 3 anos: 1 gota/kg/dose x 2 ou 0,5 mg x 2.<br>Crianças acima de 3 anos e adultos: 1mg/dose x 2. | Gotas 1 mg/ml<br>Xarope 1 mg/5 ml<br>Comprimidos 1 mg |
| Ciclesonida | Crianças de 4 a 11 anos: 80 a 160 µg/dia; acima de 12 anos: 80 a 640 µg/dia; dose de manutenção: 80 µg, 1 x/dia. | Spray nasal 50, 80 e 160 µg |
| Cromoglicato dissodico | Spray: 5 mg/dose, de 6/6 h.<br>Sol p/ inalação: 2 ml por inalação, de 6/6 h. | Aerossol 5 mg/jato<br>Sol p/ nebulização 20 mg/ml |
| Fluticasona, Propionato | Crianças acima de 4 anos: 50 a 100 µg, 2 x/dia | *Spray* nasal aquoso 27,5 µg<br>*Spray* nasal aquoso 50 µg |
| Montelucaste Sódico | 6 meses a 12 anos: 1 sachê de grânulos orais de 4 mg; 2 a 5 anos: 1 sachê ou 1 comprimido mastigável de 4 mg; 6 a 14 anos: 1 comprimido mastigável de 5 mg; Acima de 15 anos: 1 comprimido de 10 mg, administrados 1 x/dia ao deitar. | Sachê de grânulos orais 4 mg<br>Comprimidos mastigáveis 4 e 5 mg<br>Comprimidos 10 mg |
| Zafirlucaste | Crianças de 7 a 11 anos: 10 mg, 2 x/dia; 12 anos ou mais: 20 mg, 2 x/dia. | Comprimidos revestidos de 20 mg |
| **Quimioterápicos antibacterianos** | | |
| Ácido Nalidíxico | Acima de 3 meses: 55 mg/kg/dia, de 6/6 horas.<br>Terapia de longo prazo: 33 mg/kg/dia, de 6/6 horas | Comprimidos 500 gm<br>Suspensão 250 mg/5 ml |
| Nitrofurantoína | 5 a 7 mg/kg/dia, de 6/6 horas; profilaxia: 1 a 2,5 mg/kg/dia, 1 a 2 x/dia. | Suspensão oral 5 mg/ml<br>Cápsulas 100 gm |
| **Redutor da acidez gástrica** | | |
| Hidróxido de alumínio | Neonatos: 1 ml/kg/dose, de 4/4 horas; Crianças: 5 a 15 ml, de 2/2 ou 4/4 horas. | Gel 61,5 mg/ml |
| Hidróxido de magnésio | Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 a 15 ml, até 4 x/dia; 6 a 12 anos: 15 a 30 ml, até 4 x.dia. | Solução oral 1.200 mg/15 ml |
| Omeprazol | VO – neonatos: 0,5 a 1,5 mg/kg/dose, 1 x/dia; crianças: 0,2 a 3,5 mg/kg/dia, 1 x/dia.<br>IV: 0,7 a 3,3 mg/kg/dia, 1 x/dia. | Cápsulas 10 e 20 mg<br>Comprimidos revestidos 10, 20 e 40 mg<br>Frasco-ampola 40 mg |
| Pantoprazol | De 6 a 13 anos: 20 mg, 1 x/dia | Comprimidos 20 mg |

| | | |
|---|---|---|
| | ou 0,5 a 1 mg/kg/dia. | Frasco-ampola 40 mg |
| Ranitidina, Cloridrato | VO: neonatos: 2 mg/kg/dose, de 8/8 horas; crianças: 4 a 5 mg/kg/dia, de 8/8 ou 12/12 horas.<br>Via parenteral – neonatos: 0,5 mg/kg/dose, de 12/12 h; infusão contínua IV: 0,04 a 0,08 mg/kg/hora; crianças: 2 a 4 mg/kg/dia, de 6/6 ou 12/12 horas; infusão contínua parenteral: 0,08 a 0,17 mg/kg/hora. | Comprimidos 15º mg<br>Ampolas 50 mg/2 ml<br>Solução oral 15 mg/ml |
| Sucralfato | 40 a 80 mg/kg/dia, de 6/6 horas, ou ,5 a 1 g, 4 x/dia. | Flaconete 2 mg/10 ml |
| **Vitaminas e Ferro** | | |
| Vitamina A | Casos graves – menores de 1 ano: 5.000 – 10.000 UI/dia, de 1 a 8 anos: 5.000 - 15.000 UI/dia; acima de 8 anos: 50.000 – 100.000 UI/dia.<br>Prevenção e tratamento raquitismo – crianças: 2 gotas/dia; adultos: 2 a 4 gotas/dia; manutenção: 2 gotas/dia. | Drágeas 50.000 UI<br>Frascos 150.000 UI/ml<br>Ampolas 300.000 UI |
| Vitamina $B_1$ (Tiamina) | Deficiência: 5 – 10 mg/dose, de 8/8 horas. | Comrimidos 300 gm |
| Vitamina $B_6$ (Piridoxina) | Profilaxia: 0,1 – 0,5 mg/dia, para latentes; 0,5 – 1,5 mg/kg/dia, para crianças maiores.<br>Anemia hipocrômica ou megaloblástica: 100 – 200 mg/dia, VO ou IM. | Drágea 100, 200 e 400 mg<br>Ampolas 100 mg |
| Vitamina $B_{12}$ (Cianocobalamina) | Carência: 100 µg/dia, durante 7 a 10 dias.<br>Anemia perniciosa, sem complicações: 100 µg/dia, dose única por 2 ou mais semanas, até uma dosagem total de 1.000 a 5.000 µg/mês; anemia perniciosa com complicações: 1.000 µg, 1 x/semana, durante várias meses. | Ampolas 5.000 e 10.000 µg |
| Vitamina $B_{12}$ (Coenzima) | Lactentes: 0,5 mg/kg/dia; crianças: 2 a 5 mg/kg/dia | Microcomprimidos 1 e 5 mg |
| Vitamina C | Suplemento: 35 a 50 mg/dia.<br>Escorbuto: 300 mg a 1 g/dia<br>Deficiências: 200 – 500 mg/dia | Gotas 100 e 200 mg/ml<br>Comprimidos efervescentes 1 a 2 g.<br>Comprimidos mastigáveis 500 mg |
| Vitamina K | Profilaxia da doença hemorrágica do RN: 1 mg IM ou IV, ao nascer.<br>Tratamento da doença hemorrágica do RN: 1 mg IV | Ampolas 10 mg/ml |

| | | |
|---|---|---|
| Complexo vitamínico para lactentes | 12 gotas/dia | Solução oral de polivitaminas |
| Sulfato Ferroso | Profilaxia: 1 a 2 mg/kg/dia de ferro elementar.<br>Tratamento: 4 a 5 mg/kg/dia de ferro elementar. | Solução oral 260,g/10 ml<br>Gotas 125 mg/ml<br>Cada ml contém sulfato ferroso (equivalente a 25 mg de ferro) 125 mg. |