

<b>Escore para diagnóstico presuntivo de pneumonias bacterianas e virais</b>			
	Prognosticador		Pontos
	Temperatura axilar $\geq 39^{\circ}\text{C}$		3
	Idade $\geq 9$ meses		2
	Contagem de neutrófilos $\geq 8.000 \text{ mm}^3$		2
	Bastonetes $\geq 5\%$		1
Achado radiológico*	Infiltrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bem delimitado (distribuição lobar, segmentar ou aspecto arredondado)</li> <li>• Limites imprecisos e distribuição difusa</li> <li>• Intersticial e/ou peribrônquico</li> </ul>	2 1 -1
	Localização	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lobar (um único lóbulo)</li> <li>• Lobos múltiplos em um ou ambos os pulmões, infiltrado bem delimitado</li> <li>• Localização múltipla, perihilar, infiltrados de limites imprecisos</li> </ul>	1 1 -1
	Derrame Pleural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velamento mínimo do seio costofrênico</li> <li>• Derrame evidente</li> </ul>	1 2
	Abscesso, pneumatocele e lesões bolhosas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duvidoso</li> <li>• Evidente</li> </ul>	1 2
	Atelectasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subsegmentar (múltiplas localizações)</li> <li>• Lobar (envolvendo lobo superior ou médio direito)</li> <li>• Lobar (envolvendo outros lobos)</li> </ul>	-1 -1 0
* escore radiológico de acordo com Khamapirad e Glezen			

**Interpretação:**

Escore clínico de pneumonia bacteriana  $\geq 4$  pontos

Escore radiológico de pneumonia bacteriana  $\geq 2$  pontos