

Escore para diagnóstico presuntivo de pneumonias bacterianas e virais			
	Prognosticador		Pontos
	Temperatura axilar $\geq 39^{\circ}\text{C}$		3
	Idade ≥ 9 meses		2
	Contagem de neutrófilos $\geq 8.000 \text{ mm}^3$		2
	Bastonetes $\geq 5\%$		1
Achado radiológico*	Infiltrado	<ul style="list-style-type: none"> • Bem delimitado (distribuição lobar, segmentar ou aspecto arredondado) • Limites imprecisos e distribuição difusa • Intersticial e/ou peribrônquico 	2 1 -1
	Localização	<ul style="list-style-type: none"> • Lobar (um único lóbulo) • Lobos múltiplos em um ou ambos os pulmões, infiltrado bem delimitado • Localização múltipla, perihilar, infiltrados de limites imprecisos 	1 1 -1
	Derrame Pleural	<ul style="list-style-type: none"> • Velamento mínimo do seio costofrênico • Derrame evidente 	1 2
	Abscesso, pneumatocele e lesões bolhosas	<ul style="list-style-type: none"> • Duvidoso • Evidente 	1 2
	Atelectasia	<ul style="list-style-type: none"> • Subsegmentar (múltiplas localizações) • Lobar (envolvendo lobo superior ou médio direito) • Lobar (envolvendo outros lobos) 	-1 -1 0
* escore radiológico de acordo com Khamapirad e Glezen			

Interpretação:

Escore clínico de pneumonia bacteriana ≥ 4 pontos

Escore radiológico de pneumonia bacteriana ≥ 2 pontos