

Critérios diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade – DSM-V

A	<p>1. Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção (duração mínima de 6 meses):</p> <ul style="list-style-type: none">a) Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras;b) com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas;c) com frequência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra;d) com frequência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais;e) com frequência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades;f) com frequência evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante;g) com frequência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades;h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa;i) com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias. <p>2. Seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade (duração mínima de 6 meses):</p> <ul style="list-style-type: none">a) Frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira;b) frequentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras situações nas quais se espera que permaneça sentado;c) frequentemente corre ou escala em demasia em situações nas quais isto é inapropriado;d) com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em atividades de lazer;e) está frequentemente "a mil" ou muitas vezes age com se estivesse "a todo vapor";f) frequentemente fala em demasia. <p>Impulsividade (duração mínima de 6 meses)</p> <ul style="list-style-type: none">g) Frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido completadas;h) com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez;i) frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros.
B	Alguns sintomas de hiperatividade – impulsividade ou desatenção que causam prejuízo devem estar presentes antes dos 12 anos de idade.
C	Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (escola, trabalho e em casa, por exemplo).
D	Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional.
E	Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um transtorno invasivo do desenvolvimento, esquizofrenia ou outro transtorno psicótico e não são melhores explicados por outro transtorno mental.